

Пластырь ГалтеяФарм обезболивающий с витамином Е

ИМ-7.101993/2010 до 22.10.2025

пластырь, лечебный, нестерильный, основа тканевая,
6×10 см / 10×15 см, обезболивающий

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	лечебный
Вид	нестерильный
Основа	тканевая
Размер	6×10 см / 10×15 см
Обезболивающий	Да

Дополнительные характеристики

Назначение: обладает болеутоляющим, мышечно-расслабляющим и противовоспалительным действием. Применяется для облегчения острых и хронических болей при остеохондрозе позвоночника, невралгии, люмбаго, артритах, суставном и мышечном ревматизме, малоподвижности плечевого сустава, при вывихах, растяжениях, ушибах и других травмах мягких тканей.

Основа: 100 % хлопок.

Срок годности: 4 года.

Размеры и количество в упаковке:

- 6×10 см (50 шт. / 2700 шт.)
- 10×15 см (50 шт. / 1200 шт.)

Принцип действия:

Болевые ощущения ослабляются благодаря активным компонентам, которые входят в состав пластырной массы:

- метилсалицилат - оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, вызывая раздражение кожных рецепторов, приводит к выбросу в кровь больших количеств биологически активных веществ, которые регулируют болевую чувствительность;
- витамин Е (α-токоферола ацетат) улучшает кровообращение в месте применения, обладает выраженным мембраностабилизирующим, регенерирующим и противовоспалительным свойством;
- камфора рацемическая обладает антисептическим, местнораздражающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием;
- ментол рацемический вызывает охлаждающий эффект, оказывает местноанестезирующее действие.

Способ применения: наружно.

Открыть пакет, вынуть лейкопластырь, снять с его поверхности защитную пленку (бумагу) и приклеить к сухой чистой коже в месте болевого ощущения, слегка прижимая. Использовать однократно. Продолжительность действия лейкопластыря – 8 часов. При хронических заболеваниях для получения обезболивающего эффекта утром, лейкопластырь рекомендуется наклеить вечером. При необходимости, через 3 часа после снятия лейкопластыря процедуру можно повторить.

Противопоказания: не рекомендуется применять лейкопластырь при: варикозном расширении вен, камнях в почках, открытых ранах, аллергических реакциях, беременным женщинам и детям до 3 лет.