Набор реагентов Diasens Щелочная фосфатаза

ИМ-7.100272/2306

реагенты, система открытая, ферменты, щелочная фосфатаза, метод определения кинетический / GDKC / ДЭА-буфер, объем 100 / 500 мл

Диасенс УП, Беларусь

Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	щелочная фосфатаза
Метод	кинетический / GDKC / ДЭА-буфер
Объем	100 / 500 мл
Состав набора	ЩФ100: Реагенты: 100 мл ЩФ500: Реагенты: 500 мл

Дополнительные характеристики

Щелочная фосфатаза – это фермент, который находится практических во всех тканях человека, но больше всего его вырабатывается в печени, костях, кишечнике, эндометрии (плаценте) и легких.
Информативны как повышение, так и понижение активности щелочной фосфатазы. Активность фермента увеличивается при заболеваниях костей (саркома, миеломная болезнь, болезнь Педжета), «почечном рахите», заболеваниях печени (гепатиты, инфекционный мононуклеоз, цирроз, ЦМВ у детей), язвенном колите, инфаркте легкого и почки и др. Снижение активности щелочной фосфатазы наблюдается при цинге, выраженной анемии, кретинизме, гипотиреодизме.
Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. Необходимо учитывать результаты других исследований и клиническую картину.