

Ортез для закрепления ключицы ORTEX 025

ИМ-7.102135/2003 до 05.03.2025

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт / фастекс

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт / фастекс
Материал	полиэфир / трикотажное полотно

Дополнительные характеристики

Описание изделия: Ортез состоит из захвата на локоть и фиксаторного ремня, который обеспечивает развитие достаточной компрессии, необходимой для репозиции и лечения травмированного акромиально-ключичного сустава. Ортез фиксируется ремнем вокруг верхней части грудной клетки, и тем самым предохраняет передвижение ортеза за пределы латерального конца ключичной кости. Ортез поставляется в двух размерах для левой и правой стороны.

Показания: хирургия, неврология, травматология, ортопедия, реабилитация.

Ортез для фиксации акромиального-ключичного сочленения служит для лечения подвывиха (травма акромиального-ключичного сустава Тосси I-II) или вывиха (травма акромиального-ключичного сустава Тосси III) акромиального-ключичного сустава и для долечивания данных травм в послеоперационном периоде. Ортез позволяет колебательные движения в плечевом суставе (небольшую абдукцию и сгибание), необходимые для лечения травм акромиального-ключичного сустава.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи в зоне контакта с ортезом.

Материал: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир. Дополнительные ленты с застежками «контакт»

Ортез состоит из циркулярной повязки, натягивающейся на локоть, фиксационного ремня вокруг верхней части грудной клетки и системы подвеса. Ортез сконструирован таким образом, что петли, расположенные на надплечьях через ремни, пропущенные через предплечье и локтевой сустав, обеспечивают компрессию латерального края ключицы, необходимую для репозиции подвывиха или вывиха акромиального конца ключицы. Для большей жесткости конструкции имеется еще один ремень, обеспечивающий фиксацию плеча к туловищу пациента.