Тест для иммунохроматографического выявления наркотических соединений в слюне «ИХА-НАРКО-ФАКТОР» (амфетамин)

ИМ-7.101748 до 18.08.2019

тест, анализируемый материал слюна, выявление амфетамин, время анализа 5 мин, пипетка / планшет индикаторный

ФАКТОР-МЕД ООО, Россия

Характеристики

Тип	тест
Анализируемый материал	слюна
Выявление	амфетамин
Минимально определяемая концентрация	50 нг/мл
Время анализа	5 мин
Состав теста	пипетка / планшет индикаторный

Дополнительные характеристики

Тест ИХА-НАРКО-ФАКТОР предназначен для in vitro (вне организма) одноэтапного быстрого качественного выявления амфетамина в слюне человека методом иммунохроматографичеекого анализа. Один Тест ИХА-НАРКО-ФАКТОР рассчитан на проведение одного определения наличия амфетамина в слюне человека. 10 мл слюны необходимо собрать в чистый сухой пластиковый или стеклянный контейнер, не содержащий консервантов. В случае затруднения сбора слюны следует предложить пациенту приоткрыть рот и прижать язык к твердому небу. При наличии в собранной слюне большого количества пузырьков воздуха необходимо размешать чистой палочкой слюну для удаления воздуха, т.к. его наличие может задержать прохождение слюны через абсорбирующий участок планшета и замедлить проведение анализа. Образцы слюны можно хранить при температуре (+2-8°C) не более 7 дней или при температуре минус 20°C и ниже не более 3 месяцев. Охлажденные или замороженные образны перед проведением анализа должны быть доведены до комнатной температуры (+18-25°C). Образцы слюны, содержащие видимый осадок или помутнение, перед проведением анализа должны быть отцентрифугированы или же для анализа должна использоваться аликвота, не содержащая осадка или помутнения.